

Mușcată curgătoare

Mușcata este o plantă perenă adesea cultivată ca anuală în regiunile reci. Se numără printre florile de vară cele mai căutate. Frunzele sunt frumoase, deseori rotunjite și ușor parfumate.

Se udă de câte ori este nevoie pentru a preveni ofilirea, pământul fiind lăsat să se usuce între udări.

Poate fi expusă în zone de soare direct până în zone de penumbră.

Mușcata este livrată în ghiveci de 12 cm diametru și se recomandă a nu se transplanta pe toată durata înfloririi.

Plantele produse de noi conțin fertilizatori cu eliberare controlată, care vor asigura hrana plantei pe întreaga durată de viață a acesteia.

Se vor îndepărta florile după ofilire pentru a favoriza înlocuirea lor.

Înmulțire

Înmulțirea prin **butași** este mai sigură și mai rapidă, planta tânără păstrând trăsăturile plantei mame.

Boli și dăunători

Botrytis cinerea - Putregaiul cenușiu este o boală care acționează în perioadele reci și este determinată de umiditatea ridicată a solului și a aerului sau de persistența apei pe frunze. Organele atacate se înmoaie și se acoperă în scurt timp cu un mucegai cenușiu, ulterior țesuturile afectate se brunifică și se usucă. La combatere, organele puternic afectate se vor îndepărta, se va intensifica circulația aerului printre plante (se răresc) se va evita fertilizarea în exces cu azot, se va încerca udarea plantelor numai la bază. Concomitent se aplică tratamente foliare cu Captan, Bravo

sau Rovral etc. de regulă 1-3 pulverizări la intervale de 7 -10 zile.

Rugina se manifestă prin apariția pe frunze a unor pete mici de culoare galbenă care se întind rapid. Ciuperca poate supraviețui de la un an la altul în resturile de plante infectate. Se recomandă îndepărtarea și distrugerea frunzelor bolnave sau a plantelor puternic atacate. Se va evita udarea plantelor pe frunze. Cele mai bune rezultate în combaterea agentului patogen se obțin prin tratamente cu Dithane, Bravo, care se repetă la 6-8 zile, Rubigan, Sapro, la 12-14 zile.