



Verbenă curgătoare - Urzicuță

Verbena este o plantă anuală deosebit de decorativă prin inflorescențele așezate în vârful lăstarilor.

Trebuie udată din abundență în special în timpul perioadelor calde.

Preferă un sol bine drenat, poziționat în soare direct. Înflorește din plin pe toată perioada verii și toamnei și mai puțin în perioadele de caniculă.

Planta este livrată în ghiveci suspendat de 19 cm diametru și se recomandă a nu se transplanta pe toată durata înfloririi.

Plantele produse de noi conțin fertilizatori cu eliberare controlată, care vor asigura hrana plantei pe întreaga durată de viață a acesteia. Totuși atunci când verbena curgătoare este expusă la temperaturi de peste 35 de grade, cu soare pe întreaga durată a zilei, vă recomandăm următoarele:

- udarea se va face zilnic, până la saturație, dimineața devreme;
- dacă se constată îngălbenirea frunzelor de la vârfuri (cloroză) înseamnă că planta suferă de un deficit de fier, care poate avea două cauze:
 - a. lipsa fierului suplimentar din fertilizatori - nu e cazul la plantele produse de noi;
 - b. micșorarea acidității substratului din cauza folosirii unei ape de udare dure (apă de fântână). De obicei apare și o alungire a ramurilor din cauza dificultăților de absorbție a fertilizanților. Soluția este mutarea plantei din soare, udarea până la saturație cu apă de ploaie (un fel de spălare a substratului) și folosirea pentru următoarele două săptămâni a unui îngrășământ lichid cu aciditate crescută. Concomitent se scurtează ramurile alungite cu două treimi.

Înmulțire

Prin **semințe** care se seamănă în februarie-martie în adăposturi pentru o înflorire timpurie, sau direct în câmp, în mai pentru o înflorire la sfârșitul verii.

Reproducerea prin **butași** se face la începutul toamnei. După ce le apar rădăcinile butașii vor fi mutați în ghivece și abia în primăvara următoare plantați în aer liber.

Boli și dăunători

În timpul verii **făinarea** este principala boală care poate să apară, identificată printr-un puf de culoare albă prezent pe frunze. Tratamentul, care printre altele, duce și la deprecierea florilor, se face cu un fungicid pe bază de sulf (Microthiol Special, Shavit, Rubigan) prin stropiri la interval de 7-10 zile, și îndepărtarea factorului de stres (mărirea umidității).

Botrytis cinerea - Putregaiul cenușiu este o boală care acționează în perioadele reci și este determinată de umiditatea ridicată a solului și a aerului sau de persistența apei pe frunze. Organele atacate se înmoaie și se acoperă în scurt timp cu un mușgai cenușiu, ulterior țesuturile afectate se brunifică și se usucă. La combatere, organele puternic afectate se vor îndepărta, se va intensifica circulația aerului printre plante (se raresc) se va evita fertilizarea în exces cu azot, se va încerca udarea plantelor numai la bază. Concomitent se aplică tratamente foliare cu Captan, Bravo sau Rovral etc. de regulă 3-5 pulverizări la intervale de 7 - 10 zile.